

NOVINKA

HEAVIS

1,5 mg potahované tablety
cytisiniklin



DNÍ
LÉČBY

BUĎTE KATALYZÁTOREM ZMĚNY



LÉK K ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ



ADAMED
Pro Rodinu

Přestat kouřit **může prodloužit život**
Vašeho pacienta až o 8 let¹

Urologické problémy související s kouřením



Kouření a rakovina močového měchýře

- Kouření je dobře známým příčinným faktorem vzniku karcinomu močového měchýře a **tvoří 50 % všech případů**.²
- Kuřáci mají **prokazatelně vyšší riziko** recidivy (OR* = 1,68), progresu (OR = 1,18) a relativní riziko úmrtí na rakovinu močového měchýře.²
- Analýza podskupin 2967 pacientů odhalila, že **současní kuřáci** měli o 1,24 vyšší riziko recidivy (OR = 1,24; 95% CI: 1,02-1,50; P = 0,03) **ve srovnání s bývalými kuřáky**.²



Kouření a rakovina prostaty

- Kouření zvyšuje zánět v prostatě, což zvyšuje nejen riziko vzniku rakoviny, ale také riziko vzniku agresivnější formy onemocnění.³
- Kuřáci, u nichž se rakovina prostaty objeví, mají **výrazně horší prognózu**.³
- Úmrtnost na rakovinu prostaty je u současných kuřáků **o 42 % vyšší**.³



Kouření a erektilní dysfunkce

- **52 % mužů** stáří 40-70 let trpí různým stupněm erektilní dysfunkce (ED).⁴
- Bývalí kuřáci mají **nižší riziko erektilní dysfunkce než současní kuřáci** (s poměrem šancí 1,81 a 1,25).⁵
- Ve skupině mužů s ED, kteří přestali kouřit, **hlásilo více než 50 % zlepšení erektilní funkce po 6 měsících**.⁴

Otevřete s pacientem téma závislosti a nabídněte pomoc, která zvyšuje pacientovu šanci úspěšné léčby odvykání kouření.

ZÁVISLOST na tabáku JE NEMOC

Dg. F17.2⁶



přehledný
blister, který

**organizuje
dávkování**



Lék k odvykání kouření a snížení chuti na nikotin

u dospělých kuřáků, kteří **jsou ochotni přestat kouřit**

- cílem léčby je **trvalé ukončení** používání výrobků obsahujících nikotin
- postupně **snižuje závislost** na nikotinu
- **zmírňuje** abstinenční příznaky
- **neobsahuje** nikotin

- doba léčby **25 dní**
- **jedno balení postačuje** ke kompletní léčebné kúře
- užívání ve formě **tablet**
- **dobrá snášenlivost** prokázaná klinickými studiemi


- **bez** lékařského předpisu

HEAVIS neobsahuje nikotin, nahrazuje ho

Léčivou látkou přípravku HEAVIS je rostlinný alkaloid cytisiniklin (dříve známý jako cytisin) s chemickou strukturou podobnou nikotinu.

Působení cytisiniklinu je podobné nikotinu, ale je obecně slabší.

Cytisiniklin s nikotinem soutěží o stejné receptory a díky své silnější vazbě **postupně nikotin vytěšňuje**.



Dvojitý mechanismus protikuřáckého účinku cytisiniklinu⁸

1. ČÁSTEČNÝ AGONISTA

Cytisiniklin se váže na receptor a částečně stimuluje uvolňování dopaminu: **Snižuje touhu po nikotinu a snižuje závažnost abstinčních příznaků**

2. ČÁSTEČNÝ ANTAGONISTA

Vazba cytisiniklinu na receptor brání vazbě nikotinu: **Odstraňuje „nikotinem vyvolanou“ odměnu a uspokojení spojené s kouřením.**

Profil pacienta

- Dospělý do 65 let, který **denně kouří** a **je závislý na nikotinu**
- Má pevný **záměr vzdát se cigaret**
- **Pokoušel se** přestat kouřit v minulosti, **ale neuspěl**
- Hledá **bezpečný a účinný způsob, jak přestat kouřit**

přehledný
blistr, který

organizuje
dávkování



BEZ
RECEPTU



ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Název přípravku: HEAVIS 1,5 mg potahované tablety. **Složení:** Jedna potahovaná tableta obsahuje 1,5 mg cytisiniklinu (dříve používaný název cytisin). **Indikace:** Odyvkání kouření a snížení chuti na nikotin u dospělých kuřáků, kteří jsou ochotni přestat kouřit. Užívání umožňuje postupné snižování závislosti na nikotinu a odvykání kouření bez nikotinových abstinenčních příznaků. Cílem léčby je trvalé ukončení používání výrobků obsahujících nikotin. **Dávkování a způsob podání:** Jedno balení přípravku (100 tablet) postačuje ke kompletní léčebné kúře. Doba trvání léčby je 25 dní. Přípravek se užívá podle předepsaného léčebného plánu. Blistr je označen pro sobě jdoucími dny užívání přípravku. Podrobnosti dávkování viz. bod 4.2 SPC. Osoba, která kouří, by měla zcela přestat kouřit nejdříve 5. den léčby. S kouřením není možné pokračovat během léčby, protože to může zhoršit nežádoucí účinky (viz bod 4.4 SPC). Osoba, která přestala kouřit, nesmí vykouřit ani jedinou cigaretu. Pokud je léčba neúspěšná, je nutné ji ukončit a je možné s ní znovu začít za 2 až 3 měsíce. Podrobnosti k dávkování u zvláštních skupin pacientů (viz bod 4.4 SPC). Přípravek se má užívat perorálně s dostatečným množstvím vody. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 SPC, nestabilní angina pectoris, anamnéza nedávného infarktu myokardu, klinicky významné arytmie, anamnéza nedávné cévní mozkové příhody, těhotenství a kojení. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Přípravek mohou užívat pouze osoby s vážným úmyslem zbavit se závislosti na nikotinu. Je třeba, aby si pacient byl vědom toho, že současně podávání léku a kouření nebo používání výrobků obsahujících nikotin může vést ke zhoršení nežádoucích účinků nikotinu. Přípravek je nutné užívat s opatrností v případě ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, hypertenze, feochromocytomu, aterosklerózy a jiných periferních cévních onemocnění, žaludečního a duodenálního vředu, gastroezofageálního refluxu, hypertyreózy, diabetu a schizofrenie. Detailní popis zvláštních upozornění a opatření viz bod 4.4 SPC. **Interakce:** Přípravek není možné užívat s přípravky k léčbě tuberkulózy. Žádné další klinické údaje o významné interakci s jinými léky nejsou k dispozici, popis interakcí viz bod 4.5 SPC. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Heavis je v období těhotenství a kojení kontraindikován (viz bod 4.3 SPC). Žádné údaje ohledně vlivu na fertilitu nejsou k dispozici. Ženy ve fertilním věku musí během léčby používat velmi účinnou antikoncepci (viz body 4.5 a 4.4 SPC). **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Heavis nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji se vyskytují změna chuti k jídlu (většinou zvýšená), nárůst tělesné hmotnosti, závrať, podrážděnost, změny nálady, úzkost, poruchy spánku (insomnie, ospalost, letargie, abnormální sny, noční můry), bolest hlavy, problémy s koncentrací, tachykardie, pomalá tepová frekvence, hypertenze, sucho v ústech, průjem, nauzea, změny chuti, pálení žáhy, zácpa, zvracení, bolest břicha (zejména horní poloviny břicha), abdominální distenze, pálení jazyka, vyrážka, myalgie, vyčerpání, malátnost. Úplný výčet, včetně četnosti výskytu n. ú., viz bod 4.8 SPC. **Doba použitelnosti:** 3 roky. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Balení:** 100 potahovaných tablet. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Adamed Pharma S.A., Pierśków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polsko. **Registrační číslo:** 87/016/21-C. **Datum schválení SPC:** 19. 1. 2023.

PŘED VYDÁNÍM PŘÍPRAVKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Výdej léčivého přípravku Heavis je možný bez lékařského předpisu a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost.

REFERENCE: SPC: Souhrn údajů o přípravku HEAVIS, dostupné z: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciva.html#/leciva/O268928
1. Le. T.T.T. et al. The benefits of quitting smoking at different ages. *Am J Prev Med.* 2024. doi.org/10.1016/j.amepre.2024.06.020;
2. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (2023) 149: 2673–2691; **3.** Tob Induc Dis. 2023 Feb 6; 21: 19. doi: 10.18332/tid/157231; **4.** Andrologia. 2015 December; 47(10): 1087–1092. doi: 10.1111/and.12393; **5.** J Sex Med 2021; 18: 121–143; **6.** Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Mezinárodní klasifikace nemocí – MKN-10 [online]. Praha: ÚZIS ČR, [cit. 10. 7. 2025]. Dostupné z: <https://klasifikace.uzis.cz/mkn10>; **7.** <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1407764>; **8.** Expert Opin Investig Drugs. 2008 Oct; 17(10): 1473–85 / *poměr šanci