Bolest a zánět v krku?



NOVINKA!

S osvěžující příchutí máty

- zmírňuje bolest
- bojuje proti bakteriím



VIATRIS

Trojkombinace – lokální antibiotikum bez zkřížené rezistence[1,2] v kombinaci s antiseptickou a místně znecitlivující látkou



Léčba zánětů faryngu a ústní dutiny, jako je např. faryngitida s bolestí v hrdle a dysfagií, záněty ústní sliznice a gingivitida.

Dávkování:

- Dospělí a dospívající od 12 let
- 1–2 pastilky několikrát denně (každé 2 až 3 hodiny)
- Nemá se překračovat denní dávka 8 pastilek
- Léčba má pokračovat ještě jeden den po odeznění příznaků!


Na lékařský předpis

Kód SÚKL	název LP	síla	balení	úhrada
274864	**DORITRI** MÁTA	0,5MG/1MG/1,5MG PAS20	20 pastilek	✕

VIATRIS

Doritri®

Máta



Tyrothricin (0,5mg)

antibiotikum (peptidová směs složená z 80 % tyrocidinů a 20 % gramicidinů), působí především proti grampozitivním (zejména streptokokům a stafylokokům), ale také několika gramnegativním bakteriím.[2,3] Tyrothricin se nevstřebává a nemá vliv na střevní mikrobiální flóru.

Benzalkonium-chlorid (1 mg)

antiseptikum působí proti širokému antibakteriálnímu spektru jak grampozitivních, tak gramnegativních bakterií.

Benzokain (1,5 mg)

lokální **anestetikum**.



Základní informace o přípravku
Doritri Máta 0,5 mg/1 mg/1,5 mg lisované pastilky

Složení: 1 pastilka obsahuje 0,5 mg tyrothricinu, 1,0 mg benzalkonium-chloridu a 1,5 mg benzokainu. Pomocné látky se známým účinkem: sorbitol (E420), sacharóza, silice máty rolní, sodík. **Indikace:** Lokální krátkodobá podpůrná léčba mírných až středně závažných zánětů faryngu a ústní dutiny, např. faryngitidy s bolestí v hrdle a dysfagií, zánětů ústní sliznice a gingivitidy, u dospělých a dospívajících od 12 let. **Dávkování a způsob podání:** Dospělí a dospívající od 12 let: 1–2 pastilky každé 2–3 hodiny, max. 8 pastilek denně; léčba pokračuje ještě 1 den po odeznění příznaků. Pouze ke krátkodobé léčbě. Pastilka se nechá pomalu rozpustit v ústech; nežvýká se ani nepolyká celá. Neužívat před ani po čištění zubů. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé nebo pomocné látky, větší otevřené rány v ústech nebo hltanu, děti do 2 let. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** U purulentní tonzilitidy s horečkou rozhoduje lékař o použití jako doplňku základní léčby. Samotná lokální léčba streptokokové anginy nestačí a nechrání před pozdními komplikacemi. Při závažné faryngitidě nebo bolesti v hrdle s horečkou, bolestí hlavy, nauzeou či zvracením je třeba konzultovat lékaře; objeví-li se tyto příznaky během léčby, léčba se přeruší a pacient ihned kontaktuje lékaře. Lokální anestetikum může vyvolat necitlivost jazyka, ústní dutiny nebo faryngeální sliznice a zhoršit polykání. Benzokain je spojen s rizikem methemoglobinemie, zejména u dětí, pacientů s deficitem G6PD a při současném užívání látek s tímto rizikem. U pacientů s predispozicí k alergickým kožním reakcím existuje riziko senzibilizace. V těhotenství se přípravek nedoporučuje; při kojení je nutné zvážit přerušení kojení nebo léčby. Přípravek obsahuje sorbitol a sacharózu; pacienti s hereditární intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharázo-isomaltázovou deficiencí jej nemají užívat. Limonen může vyvolat alergické reakce. Více viz platné SPC. **Interakce:** Účinek benzalkonium-chloridu může být snížen anionickými surfaktanty, např. zubními pastami. Látky spojené s methemoglobinemií, např. dapson nebo jiná lokální anestetika, mohou toto riziko zvýšit. **Nežádoucí účinky:** Vzácně alergické kožní reakce, hypersenzitivní reakce včetně dechové tísně, změněné vnímání chuti nebo snížená citlivost jazyka. Velmi vzácně methemoglobinemie, laxativní účinek sorbitolu, zejména při vyšších dávkách. Použití tyrothricinu na čerstvé rány může způsobit krvácení. Více viz platné SPC. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Medice Pharma GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Německo. **Registrační číslo:** 69/190/23-C **Datum schválení:** 9. 9. 2025. **Způsob výdeje:** Vázaný na lékařský předpis. **Způsob úhrady:** Není hrazený z veřejného zdravotního pojištění. **Dříve, než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku (SPC).**

Reference: 1. Stauss-Grabo M. Decade-long use of the antimicrobial peptide combination tyrothricin does not pose a major risk of acquired resistance with gram-positive bacteria and Candida spp. Pharmazie 2014 Nov; 69(11): 838-841. **2.** Lang C, Staiger C. Tyrothricin--An underrated agent for the treatment of bacterial skin infections and superficial wounds? Pharmazie 2016 Jun; 71(6): 299-305. **3.** Palm J et al. Efficacy and safety of a triple active sore throat lozenge in the treatment of patients with acute pharyngitis: Results of a multi-centre, randomised, placebo-controlled, double-blind, parallel-group trial (DoriPha). Int J Clin Pract 2018 Dec; 72(12): e13272.

CZ-DORI-2026-00002

Viatris CZ s.r.o.
Evropská 2590/33C, 160 00 Praha 6, tel.: +420 222 004 400
email: czoffice@viatris.com, www.viatris.cz

VIATRIS