

Vzdělávejte se on-line  
a získejte kredity

**Současný pohled  
na využití NSA  
v muskuloskeletální  
bolesti: role kombinace  
naproxen-esomeprazol**



REFERENCE:

1. Horak P.: Místo naproxenu mezi ostatními nesteroidními antirevmatiky používanými v léčbě bolesti a zánětu u nejčastějších revmatických chorob. Interní Med. 2015; 17(5): 259–263
2. Harbin M.: Cardiovascular safety of NSAIDs, Canadian Family Physician Le Médecin de famille canadien | Vol 60: march mars 2014
3. Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration: Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013;382: 769–79

4. EmoxenPlus, Zkrácené informace o přípravku:

**Název:** Emoxen Plus 500 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním. **Složení:** Jedna tableta obsahuje 500 mg naproxenu a 20 mg esomeprazolu. **Indikace:** Přípravek je indikován k symptomatické léčbě osteoartrózy, revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy u dospělých pacientů s rizikem rozvoje žaludečních a/nebo duodenálních vředů při podávání nesteroidních antirevmatik, u kterých léčba nižšími dávkami naproxenu nebo jinými NSAID není dostatečně účinná. **Dávkování a způsob podání:** Doporučená dávka je jedna tableta (500 mg/20 mg) dvakrát denně. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky nebo pomocné látky; astma, kopřivka nebo alergická reakce po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID; třetí trimestr gravidity; těžká porucha funkce jater; těžké srdeční selhání; těžká porucha funkce ledvin, aktivní peptický vřed; gastrointestinální krvácení, cerebrovaskulární krvácení, jiné krvácivé poruchy; souběžné podávání s atazanavirem a nelfinavirem. **Zvláštní upozornění:** Vzhledem k riziku nežádoucích účinků je potřeba vyloučit souběžné podávání přípravku a jiných NSAID. Lze užívat současně s nízkou dávkou ASA. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů s anamnézou gastrointestinálního onemocnění nebo vředu, s anamnézou hypertenze a/nebo mírného a středně těžkého městnavého srdečního selhání, s anamnézou astmatu, s poruchou

funkce ledvin nebo s poruchou koagulace aj. Esomeprazol může snižovat absorpci vitamínu B12. Dlouhodobě léčení pacienti musí být pravidelně kontrolováni. Obsahuje laktózu. **Interakce:** Vzhledem k riziku rozvoje nežádoucích účinků, je zapotřebí opatrnosti při souběžném podávání přípravku Eموxen Plus a takrolimu, cyklosporinu, diuretik, selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, kortikosteroidů, ACE inhibitorů, digoxinu, lithia, methotrexátu, derivátů sulfonylurey a hydantoinů, antikoagulancii a inhibitory agregace trombocytů, beta blokátorů, probenecidu a léčiv s absorpcí závislou na žaludečním pH. Preventivně je třeba zabránit současnému užívání přípravku a klopidoغrelu. **Těhotenství a kojení:** V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nemá být přípravek podáván. Během třetího trimestru těhotenství je přípravek kontraindikován. Přípravek se nemá podávat v průběhu kojení. **Nežádoucí účinky:** *Velmi časté:* dyspepsie *Časté:* závrať, bolest hlavy, poruchy chuti, hypertenze, bolest břicha, zácpa, průjem, ezofagitida, flatulence, žaludeční/duodenální vředy, gastritida, nauzea, zvracení, kožní vyrážka, artralgie, edém. **Podmínky uchovávání:** Uchovávejte v původním obalu a uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. **Držitel registračního rozhodnutí:** Bausch Health Ireland Limited, Dublin, Irsko **Registrační číslo:** 29/528/22-C **Balení dostupná na trhu:** 30/60 tablet **Datum první registrace:** 22. 2. 2024. Před předepsáním se seznamte s úplným souhrnem údajů o přípravku. Výdej pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. **Úplnou informaci o přípravku získáte na adrese:** PharmaSwiss ČR, s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.