

Polinail

S: Ciclopiroxum 80 mg v 1 g léčivého laku na nehty.

I: Mírné až středně závažné mykotické infekce nehtů způsobené dermatofyty a/nebo jinými vláknitými houbami citlivými na ciklopirox, pokud není zasaženo nehtové lůžko.

KI: Přecitlivělost na ciklopirox nebo některou z pomocných látek, děti do 18 let z důvodu nedostatečných zkušeností s používáním přípravku v této věkové skupině.

ZU: Na léčené nehty nepoužívejte současně jiné laky na nehty nebo jiné kosmetické přípravky. Obsahuje cetylstearyl alkohol, který může způsobit lokální kožní reakce.

NÚ: Velmi vzácně erytém, šupinatění, pálení a svědění v místě aplikace, reakce jsou mírné a přechodné.

TL: U těhotných a kojících žen by měla být léčba přípravkem zahájena pouze v případě, že je naprosto nezbytná a po pečlivém zvážení poměru přínosu a možných rizik lékařem

D: 1x denně v tenké vrstvě na umytý a osušený postižený nehet/nehty. Nanáší se na celou nehtovou ploténku a 5 mm okolní kůži, a pokud možno, pod volný konec nehtu. Lak je třeba nechat asi 30 sekund schnout. Ošetřené nehty se nesmí dalších alespoň 6 hodin mýt, proto se doporučuje aplikace večer před spaním. Lak není nutné odstraňovat žádnými rozpouštědly či abrazivy (pilníky), stačí nehty umýt. V případě, že dojde k nechtěnému odstranění laku umytím, může být lak opět nanesen. Obvyklá doba léčby infekce nehtů rukou je 6 měsíců, nehtů nohou 9 až 12 měsíců.

Uchovávání: Lahvičku pečlivě uzavírejte, chraňte před chladem, mohlo by dojít k reverzibilní tvorbě slabého sedimentu. Tento přípravek je hořlavý.

Reg.č: 26/611/09-C

DRR: Polichem SA., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Lucembursko.

Datum poslední revize textu SPC: 17.11.2022

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen zdravotními pojišťovnami.

Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).