

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Které z následujících příznaků mohou patřit do klinického obrazu toxického šoku?

- a) průjem
- b) porucha vědomí
- c) myalgie
- d) hyperemie sliznic

2 Pacient s PM/ICD (ambulantní lékař) by měl kontaktovat implantační centrum, pokud:

- a) chce pacient používat mobilní telefon
- b) se objeví zánět v okolí operační rány
- c) má pacient virózu
- d) se vyskytla porucha vědomí

3 Pacient s PM/ICD by se měl vyvarovat:

- a) cestování
- b) sexu
- c) kontaktních sportů
- d) běžného rekreačního sportu

4 Pacient s PM/ICD by neměl:

- a) podstupovat endoskopické vyšetření
- b) u sebe nosit neustále průkazku nositele implantabilního přístroje
- c) chodit do práce
- d) pracovat s obloukovou svářečkou

5 Jaká je přibližná prevalence arteriální hypertenze v populaci:

- a) 10 %
- b) 30 %
- c) 50 %
- d) 70 %

6 Emergentní hypertenzní krize je definována:

- a) zvýšením krevního tlaku nad hodnoty 180/120 mm Hg bez funkčního poškození cílových orgánů
- b) zvýšením krevního tlaku zpravidla nad hodnoty 220/140 mm Hg spojeným s funkčním a strukturálním poškozením cílových orgánů
- c) zvýšením krevního tlaku nad hodnoty 179/109 mm Hg se současnými papilárními exsudáty a hemoragiemi
- d) náhlým zvýšením krevního tlaku nad 140/90 mm Hg

7 Léky volby hypertenzní krize při aortální disekci jsou:

- a) urapidil a kaptopril
- b) hydralazin a spironolakton
- c) nitroprusid a intravenózní betablokátor
- d) fentolamin

8 Mezi základní preventivní opatření při léčbě osteoporózy patří:

- a) dostatečný příjem vápníku a vitamínu D
- b) léčba bisfosfonáty
- c) abstinence kouření
- d) přiměřená pohybová aktivita

9 Mezi léky s osteoanabolickým efektem patří:

- a) raloxifen
- b) teriparatid
- c) denosumab
- d) risendronát

10 Mezi faktory zohledněné ve výpočtu FRAX nepatří:

- a) BMI
- b) zlomenina v osobní anamnéze
- c) markery kostní remodelace
- d) léčba glukokortikoidy

11 Co jsou to inkretiny?

- a) střevní hormony vyplavované po perorálním příjmu potravy
- b) látky uvolňované z centrálního nervového systému
- c) hormony snižující glykemii po jídle stimulací sekrece inzulínu
- d) látky způsobující apoptózu beta buněk slinivky břišní

12 Pro Victozu platí tvrzení:

- a) užívá se jako doplněk k terapii DM 1. typu
- b) je určena výhradně k léčbě diabetiků 2. typu
- c) výskyt hypoglykemií při terapii liraglutidem je méně častý ve srovnání s léčbou glimepiridem
- d) aplikace dvakrát denně subkutánně

13 Původci hemoragických horeček jsou:

- a) RNA viry
- b) DNA viry
- c) pneumokoky
- d) riketsie

14 Přírodním rezervoárem viru hemoragické horečky Ebola jsou:

- a) jelenovití
- b) hraboši
- c) ptáci
- d) kaloni

15 Která skupina virů vyvolává hemoragickou horečku s renálním syndromem?

- a) herpetické viry
- b) koronaviry
- c) hantaviry
- d) polioviry

16 Rezervoárem žluté zimnice jsou:

- a) krysa a člověk
- b) člověk a kaloni
- c) pouze netopýři
- d) primáti a člověk

17 Podání probiotik v průběhu těžké akutní pankreatitidy je nyní:

- a) obecně indikované
- b) možné
- c) v indikovaných případech doporučené
- d) kontraindikované

18 Podání probiotik je jednoznačně indikováno u:

- a) infekčních průjmů
- b) cestovatelských průjmů
- c) průjmů po antibakteriální léčbě
- d) žádné z těchto chorob

19 Nejvyšší doporučená denní dávka sodíku:

- a) není doporučena
- b) je 65 mg na kg tělesné hmotnosti na den
- c) je 15 mg na kg tělesné hmotnosti na den
- d) je maximálně tři kávové lžičky soli denně

20 Dle zkušeností s léčbou chronické hepatitidy C má největší šanci na úspěšnou léčbu:

- a) muž 45 let, vyšší váhové kategorie, s pokročilou fibrózou jaterní tkáně
- b) mladá žena, s genotypem viru 2a, nízké tělesné váhy
- c) žena 55 let, genotyp viru 1b, přítomnost fibrózy v jaterní tkáni
- d) muž 21 let, váha 100 kg, genotyp viru 3, kvantita viremie 10^3 IU/ml

Správné odpovědi: 1. a, b, c, d 2. b, d 3. c 4. d 5. b 6. b 7. c 8. a, c, d 9. b 10. c 11. a, c 12. c 13. a 14. d 15. c 16. d 17. d 18. c 19. b 20. b