ULTOMIRIS® je indikován jako přídatná terapie ke standardní léčbě dospělých pacientů s gMG, kteří vykazují pozitivitu na protilátky proti acetylcholinovému receptoru (AChR)[1]

ULTOMIRIS®
(ravulizumab)
koncentrát pro infuzní roztok



RYCHLÝ ÚČINEK A DLOUHODOBÁ KONTROLA SYMPTOMŮ* 1–3

u dospělých pacientů s gMG a s pozitivním nálezem protilátek anti-AChR

ULTOMIRIS® je dlouhodobě† působící C5 inhibitor, který poskytuje okamžitou, úplnou a trvalou inhibici komplementu:[1–3‡]

- **rychlá a dlouhodobá kontrola symptomů:**[*1–3]
  - ULTOMIRIS® prokázal výraznější zlepšení celkového skóre MG-ADL po 26 týdnech léčby oproti placebu (ULTOMIRIS®: -3,1, placebo: -1,4, *P*<0,001)[2]
  - Zlepšení celkového skóre MG-ADL bylo pozorováno již během 1 týdne léčby přípravkem ULTOMIRIS® a setrvalo po dobu až 164 týdnů.[2,3]
- **udržovací dávka 1× za 8 týdnů**[†1]

Bezpečnostní profil léčivého přípravku ULTOMIRIS® byl hodnocen v randomizované, placebem kontrolované, multicentrické studii fáze 3 u dospělých pacientů s gMG.[2] Nejčastějšími nežádoucími účinky u ≥ 10 % pacientů užívajících léčivý přípravek ULTOMIRIS® byly bolest hlavy, průjem a nevolnost.[2] Všichni pacienti musí být nejméně dva týdny před zahájením léčby přípravkem ULTOMIRIS® očkováni proti meningokokovým infekcím.[1] Další informace o bezpečnostním profilu léku naleznete v Souhrnu údajů o přípravku ULTOMIRIS®.

* Tvrzení vychází z výsledků měření na kategorické škále Myasthenia Gravis Activities of Daily Living (Dotazník hodnocení každodenních aktivit pro myasthenia gravis MG-ADL). Tato škála hodnotí 8 každodenních aktivit a symptomů u pacientů s gMG.[2,4]

† Dávkování jednou za 8 týdnů počínaje 2 týdny po nasycovací dávce.[1]

‡ Trvalá inhibice volného sérového C5 (koncentrace < 0,5 µg/ml) přetrvávala po dobu 26 týdnů u pacientů léčených přípravkem ULTOMIRIS® ve studii fáze 3.[5]

AChR, acetylcholinový receptor; **gMG**, generalizovaná myasthenia gravis; **MG-ADL**, dotazník hodnocení každodenních aktivit pro onemocnění myasthenia gravis.

Literatura: 1. ULTOMIRIS® (ravulizumab). Souhrnná informace o přípravku, datum poslední revize textu: 09/2025. **2.** Vu T, *et al.* Terminal Complement Inhibitor Ravulizumab in Generalized Myasthenia Gravis. *N Eng J Med Evid.* 2022. **3.** Vu TH, *et al.* Long-Term Efficacy and Safety of Ravulizumab in Adults With Anti-Acetylcholine Receptor Antibody-Positive Generalized Myasthenia Gravis: Final Results From the Phase 3 CHAMPION MG Open-Label Extension. *Eur J Neurol.* 2025. **4.** Muppidi S, *et al.* MG-ADL: still a relevant outcome measure. *Muscle Nerve.* 2011;44(5):727–731. **5.** Vu T, *el al.* Ravulizumab pharmacokinetics and pharmacodynamics in patients with generalized myasthenia gravis. *J Neurol.* 2023 ;270(6)

AstraZeneca

AstraZeneca Czech Republic s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice
tel.: +420 222 807 111
www.astrazeneca.cz
CZ-8119 | Datum přípravy: 10/2025